

## PROGRAM OPORAVKA KOD CERVIKALNE SPONDILOZE

### Sažetak

*Uvod: Cervikalna spondiloza – artroza, lokalizirana na razini anatomskega elementa cervikalnega područja kralježnice se manifestira kroz restrikciju kretnjaka tijela i bol koji se može razviti radikalno kroz skapularno područje u ruke. Pojavljuje se anatomski promjena prostora spinalnog kanala i pritisak na nerv. Cilj: Promišljanja o borbi protiv bola, reducirane mišićne kontrakcije i povrat zglobove funkcije, povećana pokretljivost, kao i tonus mišića i ekstra revitalizacija. Materijal i metode: Istraživanje je provedeno na 16 odraslih pacijenata, 9 muškaraca i 6 žena, uzrasta 31 – 60 godina. Oni su provodili terapiju masažom i medicinsku gimnastiku. Rezultati: Grupna analiza, nakon tretmana je pokazala: smanjenje bola u 11 slučajeva (68,75%); povećanje pokretljivosti zglobova u 10 slučajeva (62,50%); poboljšanje kondicije pacijenata u 12 slučajeva (75%). Rasprava i zaključak: Cervikalna spondiloza je najčešća bolest kralježnice. Incidencija bolesti značajno raste nakon 50-e godine života. Prema istraživanjima češća je kod žena. Kod istraživanih grupa, incidencija je bila uglavnom između C5-C6 kralježaka. Terapija lijekovima djeluje protiv cervikalnih bolova ali su učinci kratkoročni i ponekad mogu biti agresivni prema ljudima sa želučanim poteškoćama.*

**Ključne riječi:** cervikalna spondiloza, terapija masažom, vježbanje

---